



## Calendários de Vacinação da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIIm)

## Calendário de Vacinação para Adolescentes e Adultos

VACINAS	ESQUEMA BÁSICO DE DOSES	COMENTÁRIOS	DISPONIBILIZAÇÃO	
			POSTOS	CLÍNICAS
BCG ID		Reforço com a BCG está indicado em regiões endêmicas para hanseníase	sim	sim
Tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba)	dose única	Vacina contra-indicada para imunocomprometidos e gestantes	sim	sim
Vacinas contra as hepatites A, B ou A&B	hepatite A duas doses: a segunda seis meses após a primeira	1. A vacinação combinada contra as hepatites A&B é preferível à vacinação isolada contra as hepatites A e B, a menos que um diagnóstico sorológico ou clínico bem estabelecido indique imunidade para uma delas 2. Esquemas especiais de vacinação contra a hepatite B: para imunocomprometidos e renais crônicos (dose dobrada - 2ml[40mg]) e imunocompetentes de alto risco de exposição (dose normal - 1ml[20mg]): 4 doses: a segunda um mês após a primeira, a terceira, um mês após a segunda e a quarta, seis meses após a terceira. 3. Para adolescentes menores de 16 anos indica-se também a aplicação da apresentação para adultos da vacina combinada contra as hepatites A & B no esquema de duas doses: a segunda seis meses após a primeira	não	sim
	hepatite B três doses: a segunda um mês após a primeira e a terceira seis meses após a segunda		sim, até 19 anos de idade	sim
	hepatites A&B três doses: a segunda um mês após a primeira e a terceira seis meses após a segunda		não	sim
Vacinas contra difteria, tétano e coqueluche	Com vacinação básica completa reforço a cada dez anos com dTpa (Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto)	1. A vacina Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto - dTpa - (contra difteria, tétano e coqueluche) como todas as vacinas inativadas, provavelmente não é contra-indicada para gestantes; no entanto, aguardam-se os resultados de estudos para a liberação de seu uso nesse grupo. 2. Uma dose de vacina Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (dTpa) é recomendada, mesmo para indivíduos que receberam a vacina Dupla bacteriana do tipo adulto (dT) recentemente (dois ou mais meses), para prevenir a veiculação da Bordetella pertussis	sim	sim
	Com vacinação básica incompleta uma dose de dTpa (Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto) e duas doses de dT (Dupla do tipo adulto)		não	sim
varicela	a partir dos 13 anos de idade - duas doses: a segunda dois meses após a primeira	Vacina contra-indicada para imunocomprometidos e gestantes	não	sim
influenza (gripe)	dose única anual		sim para maiores de 60 anos	sim
Antipneumocócica 23 valente	dose única	1. Recomendada para maiores de 60 anos de idade e indivíduos com doenças crônicas, como cardiopatas, pneumopatas, diabéticos e outros considerados de risco para a doença pneumocócica	sim para maiores de 60 anos e doentes crônicos	sim
Antimeningocócica C conjugada	dose única	Indicada para habitantes de áreas endêmicas ou com alta incidência de doença meningocócica	não	sim
febze amarela	uma dose de dez em dez anos	1. Indicada para habitantes de áreas endêmicas de febre amarela e para os que para lá se dirigem, e também para atender exigências sanitárias de viagens internacionais 2. Vacina contra-indicada para os imunocomprometidos e gestantes, exceto quando os riscos da doença superam os riscos da vacinação	sim	não