

Calendários de Vacinação da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIIm)

Calendário de Vacinação da Mulher

Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIIm)				
VACINA	ESQUEMA DE DOSES	NÃO GESTANTE	GESTANTE	PUÉRPERA
Tríplice viral sarampo, rubéola e caxumba	dose única	sim	não	sim
hepatites A, B ou A&B	hepatite A duas doses: a segunda seis meses após a primeira	sim	sim	sim
	hepatite B três doses: a segunda um mês após a primeira e a terceira seis meses após a segunda.			
	hepatites A&B três doses: a segunda um mês após a primeira e a terceira seis meses após a segunda.			
Vacinas contra difteria, tétano e coqueluche	Com vacinação básica completa reforço a cada dez anos com dTpa (Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto)	sim	sim para Dupla (dT) e não para Tríplice (dTpa)	sim
	Com vacinação básica incompleta uma dose de dTpa (Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto) e duas doses de dT (Dupla bacteriana do tipo adulto)			
	Durante a gestação para a mulher grávida, mesmo que esteja com a vacina em dia, mas recebeu sua última dose há mais de cinco anos: uma dose de dT (Dupla bacteriana do tipo adulto)			
varicela	1 a 12 anos de idade: dose única Maiores de 13 anos: duas doses, a segunda dois meses após a primeira	sim	não	sim
influenza (gripe)	dose única anual	sim	sim	sim
febre amarela	uma dose de dez em dez anos	sim	não	sim
Antimeningocócica C conjugada	dose única	sim	sim	sim

Sempre que possível evitar a aplicação de vacinas no primeiro trimestre de gravidez.

Vacinas de vírus vivos (Tríplice viral, varicela / febre amarela) devem ser, se possível e de preferência, aplicadas pelo menos um mês antes da gravidez e nunca durante a mesma.