

Calendários de Vacinação da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm)

Calendário de Vacinação Ocupacional

Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm)												
VACINAS	ESQUEMA DE DOSES	PROFISSIONAIS POR ÁREA DE ATUAÇÃO*										
		SAÚDE	ALIMENTOS E BEBIDAS	MILIT., POLÍCIAS E BOMB.	SANITÁRIOS	CRIANÇAS	ANIMAIS	PROFISSIONAIS DO SEXO	ADMINISTRATIVA	AVIAÇÃO	QUE VIAJAM MUITO	MANICURES E PEDICURES
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) ¹	dose única	sim	-	sim	-	sim	-	sim	-	sim	sim	-
hepatites A, B ou A&B ^{2,3}	hepatite A duas doses: a segunda seis meses após a primeira	sim	sim	sim	sim	sim	-	sim	-	sim	sim	-
	hepatite B três doses: a segunda um mês após a primeira e a terceira seis meses após a segunda.	sim	-	sim	sim	-	-	sim	-	sim	sim	sim
	hepatite A&B três doses: a segunda um mês após a primeira e a terceira seis meses após a segunda.											
Vacinas contra difteria, tétano e coqueluche	Com vacinação básica completa reforço a cada dez anos com dTpa (Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto)	sim	sim	sim	sim	sim	sim	-	-	sim	-	sim
	Com vacinação básica incompleta 1 dose de dTpa (Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto) e 2 doses de dT (Dupla do tipo adulto)											
varicela ¹	a partir dos 13 anos de idade - duas doses: a segunda dois meses após a primeira	sim	-	sim	-	sim	-	-	-	sim	-	-
influenza (gripe)	dose única anual	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Antimeningocócica C conjugada	dose única	sim	-	sim	-	sim	-	-	-	sim	-	-
febre amarela ¹	uma dose de dez em dez anos	-	-	sim	-	-	-	-	-	sim	-	-
raiva (obtida de cultura celular)	três doses: a segunda sete dias após a primeira e a terceira 14 a 21 dias após a segunda	-	-	-	-	-	sim	-	-	-	-	-

* **Profissionais da saúde:** médicos, enfermeiros e técnicos e auxiliares de enfermagem, patologistas e técnicos de patologia, dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, pessoal de apoio, manutenção e limpeza de ambientes hospitalares, maqueiros, motoristas de ambulância, técnicos de RX, e outros profissionais que frequentam assiduamente os serviços de saúde, tais como representantes da indústria farmacêutica; **Profissionais que lidam com alimentos e bebidas:** profissionais lotados em empresas de alimentos e bebidas – cozinheiros, garçons, atendentes, pessoal de apoio, manutenção e limpeza, entre outros; **Profissionais que lidam com dejetos e/ou águas potencialmente contaminadas:** mergulhadores, salva-vidas, guardiões de piscinas, manipuladores de lixo e/ou esgotos / águas fluviais, profissionais da construção civil; **Profissionais que trabalham com crianças:** professores e outros profissionais lotados em escolas, creches e orfanatos; profissionais que lidam com animais: veterinários e outros profissionais que lidam com animais, e também os frequentadores e visitantes de cavernas; **Profissionais do sexo:** considerados de risco para as DSTs e doenças infecciosas ainda não controladas em outros países do mundo; **Profissionais administrativos:** que trabalham em escritórios, fábricas e outros ambientes geralmente fechados; **Profissionais que viajam muito:** aqueles que por viajarem muito para o exterior, se colocam em risco para doenças infecciosas não controladas em outros países; **Profissionais da aviação:** pilotos, comissários de bordo; **Manicures e pedicures.**

- ¹ Vacinações contra-indicadas para os imunocomprometidos: todas as vacinas vivas (pólio oral, varicela, sarampo, rubéola, caxumba, BCG, febre amarela); em pessoas com imunocomprometimento leve, algumas dessas vacinas podem ser indicadas.
- ² A vacinação combinada contra as hepatites A&B é preferível à vacinação isolada contra as hepatites A e B, exceto quando o resultado de teste sorológico indique presença de imunidade contra uma delas.
- ³ Esquemas especiais de vacinação contra a hepatite B: imunocomprometidos e renais crônicos (dose dobrada - 2ml[40mg]) e imunocompetentes de alto risco de exposição (dose normal - 1ml[20mg]): quatro doses - a segunda um mês após a primeira, a terceira, um mês após a segunda e a quarta, seis meses após a terceira.